



КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ БЕШЕНСТВА



БЕШЕНСТВО – ОСОБО ОПАСНОЕ ИНФЕКЦИЯ, КОТОРАЯ ПОРАЖАЕТ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ, ВЫЗЫВАЯ ТЯЖЕЛЫЕ НАРУШЕНИЯ, ПРИВОДЯЩИЕ К ГИБЕЛИ

ЕЖЕГОДНО В РОССИИ 380 – 450 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОДВЕРГАЮТСЯ НАПАДЕНИЮ ЖИВОТНЫХ

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ


- ПРИ УКУСЕ
- ПРИ ПОПАДАНИИ ЗАРАЖЁННОЙ СЛЮНЫ ЖИВОТНОГО НА ПОВРЕЖДЕННЫЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ И СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ

СИМПТОМЫ:

- ЖЖЕНИЕ И ОНЕМЕНИЕ В ОБЛАСТИ УКУСА
- БЕСПОКОЙСТВО, СТРАХ, БЕССОННИЦА
- ОДЫШКА, СУДОРОГИ МЫШЦ ГЛОТКИ
- ГИДРОФОБИЯ, АЭРОФОБИЯ, АКУСТИКОФОБИЯ
- СЛЮНОТЕЧЕНИЕ, АГРЕССИЯ
- ПАРАЛИЧ МЫШЦ ЛИЦА, ЯЗЫКА, КОНЕЧНОСТЕЙ
- ПАРАЛИЧ ДЫХАТЕЛЬНЫХ И СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦ

! БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ЗАРАЗЕН

ИСТОЧНИКИ ИНФЕКЦИИ



ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ?

- ОЧИСТИТЬ РАНУ, ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫВ МЫЛОМ С ВОДОЙ
- НЕЗАМЕДЛITЬНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
- О ПОКУСАВШЕМ ЖИВОТНОМ СООБЩИТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА
УСПЕХ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО БЫСТРО НАЧАТО ЛЕЧЕНИЕ!

АНТИРАБИЧЕСКУЮ ВАКЦИНУ ВВОДЯТ 6 РАЗ:

1. В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧУ (0-Й ДЕНЬ)
2. НА 3-Й ДЕНЬ
3. НА 7-Й ДЕНЬ
4. НА 14-Й ДЕНЬ
5. НА 30-Й ДЕНЬ
6. НА 90-Й ДЕНЬ



ЕСЛИ ЗА УКУСИВШИМ ЖИВОТНЫМ УСТАНОВЛЕНО НАБЛЮДЕНИЕ, И В ТЕЧЕНИЕ 10 СУТОК ПОСЛЕ УКУСА ОНО ОСТАЛОСЬ ЗДОРОВЫМ, ТО ДАЛЬНЕЙШИЕ ИНЪЕКЦИИ ПРЕКРАЩАЮТ



ПРИ НАЛИЧИИ ПОКАЗАНИЙ, КРОМЕ ВАКЦИНЫ ОДНОКРАТНО ВВОДЯТ АНТИРАБИЧЕСКИЙ ИММУНОГЛОБУЛИН